

Durchführung der Tuberkuloseuntersuchung

* Simultantest *



Scheren und Säubern der Injektionsstellen im Bereich Nacken/Schulter (ca. 10 x 3 cm groß)
Wichtig: die Haut muss unverletzt sein!

Abmessen der Hautfaltendicke an den Injektionsstellen
Intrakutane Injektion mit kurzer Nadel und Anschliff nach außen

Oben: 0,1ml **Geflügeltuberkulin**

Unten: 0,1 ml **Rindertuberkulin**



- ⇒ An den Injektionsstellen müssen **kleine, linsengroße Quaddeln** zu fühlen sein
- ⇒ die beiden Injektionsstellen müssen gut voneinander abgegrenzt sein




AbleSEN nach 72 h (\pm 4 h)
Messung der Hautdicke mit Kutimeter



Dieselbe Person sollte mit **demselben Kutimeter** ableSEN!
Auswertung der Reaktionen - s. Rückseite

- Auswertung der Reaktionen auf Grundlage der
- beobachteten **klinischen Veränderungen** und
 - der aufgezeichneten ev. **Zunahmen der Hautfaltendicke**

Interpretation des Mono- und Simultantests:



Quelle: Bundesamt für Veterinärwesen, Bern, Schweiz